

Darmzentrum Bruchsal
Tumornachsorge – Kolorektales Karzinom

Programmierter Untersuchungen im Rahmen der Nachsorge bei kolorektalem Karzinom.

UICC Stadium I b (pT₂, pN₀, pM₀), UICC Stadium II/III (pT_{3/4}, pN₀/pT₁₋₄, pN_{1/2}, M₀)

Untersuchung	Monate										
	3	6	9	12	15	18	21	24	36	48	60
Anamnese, körperliche Untersuchung, CEA		X		X		X		X	X	X	X
Koloskopie		X ¹							X ²		
Abdomensonographie		X		X		X		X	X	X	X
Sigmoidoskopie ³		X		X		X		X			
Nachsorgetermin											
Nachsorge durchgeführt (Datum)											
Unterschrift											

¹ Wenn keine vollständige Koloskopie präoperativ erfolgt ist.

² Bei unauffälligem Befund (kein Adenom, kein Karzinom), nächste Koloskopie nach 5 Jahren.

³ Nur beim Rektumkarzinom ohne neoadjuvante oder adjuvante Radiochemotherapie.

Ergänzung

 Beim **Rektumkarzinom** Spiralcomputertomographie 3 Monate nach Abschluss der tumorspezifischen Therapie (Operation bzw. adjuvante Strahlen-/ Chemotherapie).

 Beim **kolorektalen Karzinom** und frühen Tumorstadium UICC I a (pT₁, L₀, V₀, G_{1/2}, R₀) ist eine regelmäßige Nachsorge aufgrund der günstigen Prognose (Rezidivrate 4%) nicht erforderlich.